

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Disinhibice je:

- a) závislost na sexu na internetu
- b) nadprodukce sexu v médiích
- c) ztráta zábran v chování
- d) patologická závislost na hledání údajů

2 Buprenorfin se užívá k medikované detoxifikaci při závislosti na:

- a) pervitinu
- b) extázi
- c) opiátech
- d) kokainu

3 Nejčastějším problémem mužů z infertilních párů uváděným ve vztahu k pohlavnímu životu je:

- a) obava z neuspokojení partnerky
- b) erektilní dysfunkce
- c) nadměrná vzrušivost a předrážděnost
- d) obava z intimity

4 Účinnost psychoterapie a psychosociálních intervencí vcelku u schizofrenie se nejvíce projevuje v oblasti:

- a) poruch vnímání, negativních symptomů, spolupráce při léčbě, frekvence relapsů
- b) poruch myšlení, pozitivních symptomů, spolupráce při léčbě, frekvence relapsů
- c) poruch myšlení, negativních symptomů, spolupráce při léčbě, frekvence relapsů
- d) poruch myšlení, negativních symptomů, spolupráce při léčbě, vedlejších účinků psychofarmak

5 Při indikaci psychoterapie a psychosociálních intervencí u schizofrenie platí:

- a) každý typ intervence je indikován v určité fázi vývoje poruchy
- b) jednotlivé intervence se kombinují
- c) největší význam mají v akutní fázi poruchy
- d) hledají se podskupiny pacientů vhodných pro určitý typ intervence

6 Roztroušená skleróza:

- a) je onemocnění mladých osob s typickým rozvojem prvních příznaků nejčastěji mezi 20.-40. rokem věku
- b) je ve většině případů provázena euforií neadekvátní k tíži neurologického postižení pacienta
- c) je léčebně ovlivnitelná především na počátku choroby – s délkou trvání RS a zvyšujícím se stupněm neurologického postižení na vrub neurodegenerace
- d) efektivita léků výrazně klesá

d) je diagnostikována pomocí klinických příznaků, magnetické rezonance mozku a míchy, analýzy mozkomíšního moku, případně dalších modalit (evokované potenciály, oftalmoskopie, atd.)

7 Klinický obraz psychózy navozené dlouhodobým užíváním metamfetaminu připomíná nejspíše:

- a) schizoafektivní poruchu
- b) schizofrenii
- c) depresivní epizodu s psychotickými příznaky
- d) manickou epizodu s psychotickými příznaky

8 Pro premorbidní osobnost pacienta, u kterého se později rozvine psychóza navozená metamfetaminem, jsou typické rysy:

- a) histriónské
- b) narcistické
- c) schizoidní
- d) paranoidní

9 Riziko přesmyku do hypománie či mánie při užívání antidepresiv je rizikové zvláště u pacientů:

- a) s bipolární poruchou typu II
- b) kteří souběžně užívají stabilizátory nálady
- c) s časným začátkem onemocnění
- d) kteří nadužívají či zneužívají návykové látky

10 Dlouhodobé podávání antidepresiv u pacientů s bipolární poruchou je obecně:

- a) doporučováno, profylaktický efekt antidepresiv při dlouhodobém užívání je považován za prokázaný
- b) nedoporučováno pro absenci důkazů o zlepšení prognózy pacientů při dlouhodobém užívání
- c) doporučováno jako augmentační strategie ke stabilizátorům nálady
- d) nedoporučováno především u pacientů s bipolární poruchou typu II

11 Melatonin PR je určen především:

- a) pro pacienty s poruchami spánku ve věku 3–18 let
- b) pro pacienty s poruchami spánku ve věku 18–65 let
- c) pro pacienty s poruchami spánku ve věku vyšším než 55 let
- d) pro pacienty s poruchami spánku ve věku vyšším než 65 let

12 Mezi léky způsobující nespavost nepatří:

- a) betablokátory
- b) kortikosteroidy
- c) amfetaminy
- d) antikonvulziva

Správné odpovědi: 1. c, 2. c, 3. c, 4. c, 5. a, b, d, 6. a, c, d, 7. b, 8. c, 9. d, 10. b, 11. c, 12. d