

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Komorbidní duševní poruchy u schizofrenie:

- a) nejsou podstatné, příznaky schizofrenie jsou závažnější, a proto je třeba věnovat pozornost pouze jim
- b) jejich výskyt komplikuje průběh léčby schizofrenního onemocnění, a proto je třeba jim věnovat pozornost
- c) neexistují
- d) vyskytují se až u 30 % pacientů

2 Podle dostupných literárních údajů by mohlo pozitivně ovlivnit průběh léčby schizofrenie:

- a) časné zahájení léčby
- b) léčba komorbidních poruch
- c) práce se subjektivním hodnocením léčby
- d) práce s rodinami a psychoedukace

3 Shromažďovač zvířat:

- a) se o svá zvířata vždy adekvátně stará, dává jim dostatek potravy a zajišťuje veterinární péči
- b) často shromažďuje i věci
- c) má vždy náhled na svoje chování a pokud nastane problém, začne jej řešit
- d) může mít příznaky obsedantně kompulzivní poruchy (OCD)

4 K faktorům přispívajícím k rezistenci schizofrenie patří:

- a) časný vznik poruchy
- b) pozdní vznik poruchy
- c) katatonní schizofrenie
- d) hebefrenní schizofrenie

5 Z teoretického hlediska se jako účelná jeví kombinace klozapinu s:

- a) olanzapinem
- b) amisulpridem
- c) sulpiridem
- d) risperidonem

6 Jaké je obvyklé dávkování olanzapinu v gerontopsychiatrii?

- a) 15–20 mg/den
- b) 20–30 mg/den
- c) 5–7,5 mg/den
- d) 10–15 mg/den

7 Které z uvedených látek dáme přednost při léčbě nočních delirií pacienta trpícího demencí:

- a) chlorprothixenu
- b) tiapridu
- c) quetiapinu
- d) ziprasidonu

8 Subjektivní prožívání medikace pacienty:

- a) není důležité, protože pacienti lékům nerozumějí
- b) má význam zjišťovat pouze u sugestibilních pacientů
- c) ovlivňuje následnou krátkodobou adherenci k danému léku
- d) ovlivňuje následnou dlouhodobou adherenci k danému léku

9 Nejvyšší adherence k antipsychotikům je zajištěna:

- a) edukací pacientů
- b) edukací rodinných příslušníků
- c) kontrolou pacienta ze strany sociálních pracovníků
- d) použitím injekčních dlouhodobě působících antipsychotik

10 Které z SSRI je nejčastěji spojováno při dlouhodobé léčbě s přírůstkem hmotnosti?

- a) escitalopram
- b) fluvoxamin
- c) paroxetin
- d) sertralin

11 Kdo posuzuje, zda osoba v ebrietě je schopna vyjádřit právně relevantní informovaný souhlas?

- a) ošetřující lékař
- b) pouze psychiatr, ošetřující lékař nemůže učinit právně relevantní závěr o schopnosti pacienta vyjádřit informovaný souhlas
- c) pouze psycholog
- d) právník

12 Které tvrzení je správné?

- a) fototerapie se doporučuje u pacientů se suicidálními tendencemi
- b) fototerapii je možné používat i v domácím prostředí, aniž by to mělo vedlejší účinky
- c) fototerapie se aplikuje i u pacientů s bulimií
- d) podávání melatoninu zlepšuje kognitivní funkce

Správné odpovědi: 1. b, d, 2. a, d, 3. b, d, 4. a, d, 5. b, c, d, 6. c, 7. b, 8. a, b, 9. c, 10. c, 11. a, 12. c