

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Které z uvedených funkcí jsou u pacientů se schizofrenií obvykle neporušeny?

- a) schopnost plánování a řešení problémů
- b) všeobecná informovanost a procedurální paměť
- c) formální stránka řeči
- d) sémantická a epizodická paměť

2 Která skupina symptomů není součástí Liddleova modelu (vycházejícího z BPRS)?

- a) psychomotorický útlum
- b) syndrom dezorganizace
- c) organický psychosyndrom
- d) syndrom zkreslení skutečnosti

3 U kolika procent pacientů proběhne první epizoda schizofrenie bez kognitivního poškození?

- a) 13 %
- b) 33 %
- c) 50 %
- d) 95 %

4 Dlouhodobě působící risperidon v injekční podobě v dávce 50 mg:

- a) nelze aplikovat do ramene
- b) lze aplikovat do ramene, ale pouze 1 x za 4 týdny
- c) je při ramenní aplikaci bolestivější než dávka 37,5 mg
- d) vede po aplikaci do ramene k podobné plazmatické koncentraci jako po aplikaci do gluteálního svalu

5 Kdy při výskytu závažných psychotických příznaků u demence a v případě, že selhala předchozí antipsychotika, nemůžeme použít olanzapin?

- a) při současném výskytu delirií
- b) u počínajících stadií demence
- c) pokud pacient trpí metabolickým syndromem
- d) u bronchopulmonální obstrukční choroby

6 Kterému typu antidepresiv se pokud možno vyhýbáme u osob trpících demencí?

- a) selektivním inhibitorům zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
- b) tricyklickým antidepresivům první generace
- c) selektivním inhibitorům zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)
- d) reverzibilním inhibitorům monoaminooxidázy A

7 Fibromyalgický syndrom:

- a) se rozvíjí pouze jako následek prodělaného traumatu s poškozením osového skeletu a jediná efektivní léčba je chirurgická

- b) je lehké a nevýznamné revmatické onemocnění, které nezpůsobuje invaliditu a k léčbě stačí běžná antirevmatika a analgetika
- c) je psychiatrické onemocnění, protože duševní porucha je podstatou všech dalších symptomů
- d) je těžké neurologické onemocnění na podkladě chronické ischemie mozku v oblasti povodí vertebrální arterie a léčba musí být komplexní

8 Nejvyšší prevalence fibromyalgického syndromu je:

- a) stejná u obou pohlaví bez ohledu na věk
- b) u žen v rozmezí 40–50 let věku
- c) u adolescentů
- d) u mužů ve věkové skupině 20–30 let

9 Depresivní rozlady jsou u schizofrenie:

- a) nejčastější v prodromální fázi
- b) nejčastější při negativních symptomech
- c) nejčastější v chronické fázi
- d) řídké, častěji se vyskytují u běžné populace

10 Při podezření na depresivní symptomy je správný postup:

- a) ihned nasadit antidepresiva, abychom minimalizovali suicidální rizika
- b) zjistit příčinu potíží, podle toho zvolit léčbu
- c) využít elektrokonvulzivní terapii, antidepresiva jsou neúčinná
- d) zvýšit dávku antipsychotik

11 Při nově vzniklých depresivních symptomech po nasazení antipsychotické medikace:

- a) zvýšíme dávku antipsychotika, léčba je poddávkována
- b) nasadíme antidepresiva, nejlépe SSRI
- c) snížíme dávku antipsychotika, může se jednat o nežádoucí účinek
- d) zařadíme pacienta ihned do intenzivní systematické psychoterapie, např. psychoanalytické

12 Při současném výskytu nově zjištěných depresivních symptomů a snížené kognitivní výkonnosti u pacienta, který byl dosud bez diagnózy demence:

- a) klademe důraz pouze na diagnostiku kognitivního stavu
- b) je obtížné komunikovat s nemocným, vyžádáme vyšetření specializovaného psychologa
- c) je třeba provést diferenciálně diagnostickou rozvahu deprese a demence, zvážit možnost depresivní pseudodemence. Při pochybách je doporučen terapeutický test antidepresivy (SSRI)
- d) považujeme depresivní syndromy za nejisté a nevěnujeme jim pozornost