

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Kombinace klopazinu s jinými antipsychotiky je:

- a) jasně účinnější než monoterapie klopazinem
- b) účinná pouze na pozitivní příznaky schizofrenie
- c) účinná pouze na negativní příznaky schizofrenie
- d) sporně účinnější než monoterapie klopazinem

2 Zakázanou kombinací je kombinace:

- a) klopazinu a lithia
- b) klopazinu a karbamazepinu
- c) klopazinu a elektrokonvulzivní léčby
- d) klopazinu a rTMS

3 Mezi relativní výhody KBT oproti farmakům NEpatří:

- a) chybění nežádoucích účinků a syndromu z vysazení
- b) rychlejší počáteční odezva
- c) redukce vyhýbavého chování
- d) snížení rizika relapsu

4 Anxiolytický účinek aerobního cvičení je dán převážně:

- a) psychologickými faktory
- b) expozičním působením
- c) zvyšováním serotonergní a noradrenergí neurotransmise
- d) vším výše uvedeným

5 Pro bipolární poruchu II je zvláště typické:

- a) výskyt čtyř a více afektivních epizod v průběhu jednoho roku
- b) relativně pravidelné střídání hypománií a subdepresí s krátkými bezpříznakovými obdobími
- c) v průběhu onemocnění se vyskytují jen epizody deprese, ostatní klinické charakteristiky poruchy jsou však podobné bipolární poruše I
- d) vysoká rekurence depresivních epizod a výskyt spontánních hypománií

6 O bipolární poruše II lze tvrdit:

- a) jde o méně závažnou variantu bipolární poruchy I
- b) jde o poruchu s chroničtější průběhem ve srovnání s bipolární poruchou I
- c) výskyt psychotických příznaků v rámci depresivní epizody je častější než u bipolární poruchy I
- d) odpověď na léčbu antidepresiv je obdobná jako u periodické depresivní poruchy

7 Hlavní indikace elektrokonvulzí na počátku 21. století je

- a) mánie
- b) deprese
- c) schizofrenie
- d) Parkinsonova choroba

8 Při výskytu kardiomyopatie takotsubo je třeba vyšetřit

- a) krevní tlak
- b) EKG
- c) histologicky tkáň myokardu odebranou při punkci
- d) plazmatické hladiny kardiálních enzymů

9 Prokázaný anticravingový efekt u závislosti na psychostimulanciích amfetaminového typu má:

- a) sertralin
- b) fluoxetin
- c) maprotilin
- d) fluvoxamin

10 Které z atypických antipsychotik prokázalo nejvyšší účinnost v léčbě tiků?

- a) olanzapin
- b) risperidon
- c) amisulprid
- d) quetiapin

11 Určete, které tvrzení není správné:

- a) U generalizované úzkostné poruchy je celoživotní možnost úzdravy vyšší než u deprese.
- b) Kombinovaná léčba je u pacientů s panickou poruchou účinnější než samotná medikace.
- c) Úzkostné poruchy jsou nejčastější psychiatrickou diagnózou u dětí školního věku.
- d) U posttraumatické stresové poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy nebyly prokázány pozitivní účinky cvičení.

12 Účinky elektrokonvulzí je možné posílit:

- a) snížením frekvence aplikace
- b) současným podáváním antidepresiv
- c) hyperventilací pacienta před výkonem
- d) využitím remifentanilu

Správné odpovědi: 1. d 2. b 3. b 4. d 5. d 6. b 7. b 8. a, b, d 9. b 10. b 11. a, d 12. a, b, c, d