

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá z 10 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Quetiapin je v léčbě bipolární deprese považován za:

- a) lék první volby
- b) lék první volby, ale jen v kombinaci s antidepresivem
- c) lék první volby, ale jen v kombinaci s lithiem či valproátem
- d) neúčinný

2 Riziko přesmyku do mánie při použití antidepresiv je odhadováno na:

- a) 1–6 %
- b) 7–30 %
- c) 31–50 %
- d) více než 50 %

3 Klozapin je metabolizován na aktivní metabolit převážně následujícím enzymatickým systémem:

- a) CYP 450 2D6
- b) CYP 450 2C9
- c) žádným z uvedených
- d) CYP 450 1A2

4 Při augmentaci klozapinu antidepresivy je ze skupiny SSRI relativně nejbezpečnější:

- a) citalopram
- b) paroxetin
- c) sertralin
- d) fluoxetin

5 Mezi příznaky patologické disociace nepatří:

- a) změny v prožívání identity
- b) pocity depersonalizace a derealizace
- c) denní snění
- d) disociativní amnézie

6 U kterého souboru pacientů můžeme očekávat nejvyšší míru disociace (celkové i patologické)?

- a) depresivní porucha
- b) panická porucha
- c) disociativní poruchy
- d) emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční typ

7. Dávkování a doporučená léčba rozvinutého deliria tremens je následující:

- a) haloperidol 15 mg/24 h + diazepam 80 mg/24 h
- b) clomethiazol 2,4–4,8 g/24 h + diazepam 80 mg/24 h
- c) clomethiazol 2,4–4,8 g/24 h nebo diazepam 80 mg/24 h
- d) carbamazepin 600–800 mg/24 h + valproát 1,6–2,4 g/24 h

8 Rizikovými faktory pro vznik deliria tremens jsou:

- a) křeče svalů, bolesti hlavy, nedostatek spánku
- b) křeče lýtek, hypernatremie, hypotenze
- c) křeče v břiše, abúzus alkoholu, špatná rodinná situace
- d) křečové stavy v anamnéze, hypokalemie, dříve prodělaný delirantní stav

9 Který typ demence je nejvíce zatížen psychotickými příznaky?

- a) Alzheimerova choroba
- b) demence s Lewyho tělísky
- c) vaskulární demence
- d) Huntingtonova choroba

10 Kolik procent pacientů v incipientním stadiu Alzheimerovy demence má depresivní příznaky?

- a) 50 %
- b) žádný
- c) 80 %
- d) všichni

Správné odpovědi: 1. a 2. b 3. d 4. a 5. c 6. d 7. c 8. d 9. b 10. a